

Ребенок с нормальным речевым, языковым и слуховым развитием:

Рождение - 3 месяца

- Моргает или вздрагивает при внезапных громких звуках
- Успокаивается или улыбается, когда с ним заговаривают
- Издает звуки, такие как “ооо” и “ааа”

С 4 до 6 месяцев

- Смотрит в направлении звука
- Издает различные звуки, пищит и хихикает
- Издает разные звуки, когда радуется или сердится

С 7 месяцев до 1 года

- Поворачивает голову в направлении громких звуков
- Понимает “нельзя-нельзя” или “пока-пока”
- Лепечет, например, “баба,” “мама,” “гага”
- Повторяет за вами простые слова и звуки
- Правильно использует слова “мама” или “дада”
- Реагирует на пение или музыку
- Показывает на любимые игрушки или предметы, если его просят

Если у вас есть вопросы по поводу слуха вашего ребенка или этого перечня, обращайтесь к врачу вашего ребенка.

Информацию для этой брошюры предоставили «Health Resources and Services Administration (Администрация по вопросам медицинских ресурсов и услуг)» и Washington State Department of Health (Отдел здравоохранения штата Вашингтон).

Где можно получить дополнительную информацию?

Звоните в Департамент здравоохранения штата Вашингтон (Washington State Department of Health) по телефону 206-418-5613 или смотрите наш веб-сайт по адресу: www.doh.wa.gov/earlyhearingloss

Результаты проверки слуха вашего ребенка

Имя вашего ребенка

Дата и время

Родильное учреждение

Имя сотрудника, проводившего проверку

Правое ухо: ПРОШЕЛ Левое ухо: ПРОШЕЛ
 НАПРАВИТЬ НАПРАВИТЬ

Если результаты проверки слуха вашего ребенка оказались неудовлетворительными, указанный ниже прием назначен для проведения следующей проверки слуха вашего ребенка.

Дата и время

Место

Номер телефона

Пожалуйста, позвоните, если вам нужно перенести прием.


Washington State Department of Health
DOH 344-036 May 2014 Russian


Seattle Children's
HOSPITAL • RESEARCH • FOUNDATION

Лица, имеющие инвалидность, могут получить этот документ в другом формате по просьбе. Чтобы подать просьбу, пожалуйста, звоните по телефону 1-800-525-0127 (TDD/TTY для лиц с нарушениями слуха/речи 711).

Может ли ваш ребенок слышать?

Первая проверка слуха вашего ребенка





Почему надо проверять слух вашего ребенка?

- Хотя у большинства младенцев при рождении хороший слух, некоторые не могут нормально слышать.
- Проверку делают всем младенцам, чтобы удостовериться, что они нормально слышат.
- Проверка слуха новорожденных позволяет выяснить, нет ли у ребенка потери слуха.
- Важно выявить потерю слуха как можно раньше. Если потеря слуха обнаружена в раннем возрасте, детям будет легче учиться.
- Если у ребенка обнаружили потерю слуха, существует много способов для оказания ребенку безотлагательной помощи.

Позаботьтесь, чтобы вашему ребенку проверили слух до выписки из больницы.



Что мне надо знать о проверке слуха новорожденных?

- Проверка является безопасной, безболезненной и может быть проведена в течение 10–20 минут.
- Большинство младенцев спит во время проведения проверки.
- Новорожденный с потерей слуха может плакать или производить впечатление, что он(а) реагирует на звуки так же, как ребенок с нормальным слухом. Только проверка слуха может выявить потерю слуха у младенца.



Почему результаты проверки слуха некоторых младенцев оказываются неудовлетворительными?

- Некоторым младенцам может понадобиться еще одна проверка, в связи с тем, что:
 - У ребенка была жидкость в ухе
 - В кабинете, где проводилась проверка, было шумно
 - Ребенок много двигался
 - У ребенка потеря слуха
- У большинства младенцев, которым понадобилась еще одна проверка слуха, отмечается нормальный слух. У некоторых может быть обнаружена потеря слуха.

Если результат проверки слуха вашего ребенка оказался неудовлетворительным, позаботьтесь о том, чтобы в кратчайший срок была проведена еще одна проверка.



Может ли так случиться, что результат проверки слуха у новорожденного ребенка был удовлетворительным, а у ребенка при этом наблюдается потеря слуха?

- Да, у некоторых младенцев слух достаточный для удовлетворительного прохождения первой проверки, но позже они теряют слух как следствие:
 - Некоторых болезней
 - Некоторых лекарств
 - Некоторых травм
 - Потеря слуха является семейным заболеванием
- Следите, не появились ли признаки потери слуха по мере роста ребенка.
- Используйте перечень на последней странице в качестве руководства.

